

Rapport d'avancement sur

Prévision Numérique du Temps

Résultat attendu 2 - Extension du Système Locale d'Alerte Précoce pour les Inondations

Activité R2.2. Suivi et prévision des débits

Action v. **Intégration des prévisions météorologiques numériques pour introduire dans le système la composante météo finalisée à l'alerte des évènements orageux intenses**

Période 22/06/2023-21/06/2025

Préparé par :

Vieri Tarchiani (IBE-CNR)

Avec la contribution de :

Francesco Pasi (IBE/LaMMA)

Valerio Capecchi (LaMMA)

Ousmane Baoua (DMN)

Lazare Sawadogo (ANAM)

Younoussa Adamou Sayri (DMN/IBE)

Thomas Rakiswende Bere (ANAM/IBE)

Ver. 1 du 20/05/2025



Politecnico di Torino



Direction de la Météorologie
Nationale
Direction des Ressources en Eau
Niger



Sommaire

1. Contexte	4
2. Activités réalisées	6
2.1 Atelier de formation 2023	7
2.2 Pre-test 2023	7
2.3 Atelier de formation 2024	10
2.4 Test 2024	11
2.4.1 Niger	11
2.4.2 Burkina Faso	13
2.5 Stage de recherche en Italie	14
3. Vérification WRF	14
3.1 JAS 2023-2024	15
3.1.1 Hindcast	15
3.1.2 Méthodes d'évaluation	17
3.1.3 Résultats et Comparaison des Modèles	18
3.2 Ateliers de restitution des résultats à la mi-parcours	20
4. MOLOCH	21
5. Chaines opérationnelles WRF et MOLOCH	25
6. Climatologie haute résolution Afrique de l'Ouest	27
7. Conclusions	28
Annexes	30
Annexe 1, Bibliographie	30
Annexe 2, Ressources on-line pour la formation des Equipes	31
Annexe 3, Composition des Equipes	32

Liste des figures

Figure 1, Interface de visualisation WRF DMN	8
Figure 2, Disponibilité des différents runs à la DMN en 2023	8
Figure 3, Configurations de WRF, au Niger et Burkina en 2023	9
Figure 4, Microphysique de WRF au Niger, Burkina et Italie en 2023	9
Figure 5, Prévision du 15 août 2024.....	11
Figure 6, Prévision du 03 septembre 2024.....	12
Figure 7, Paramètres disponibles en 2024.....	12
Figure 8, Fenêtres utilisées au Burkina Faso en 2024.....	13
Figure 9, Domaine utilisé pour la vérification de WRF	15
Figure 10, Configuration WRF-Niger.....	16
Figure 11, Configuration WRF-Burkina	16
Figure 12, Scores de verificationn ponctuelle	17
Figure 13, Fraction skill score	18
Figure 14, Scores deterministes	18
Figure 15, Fractional Skill Scores	19
Figure 16, Cas d'étude 20 aout 2024	20
Figure 17, MOLOCH vs WRF	23
Figure 18, Cas d'étude MOLOCH	24
Figure 19, Plan d'opérationnalisation MOLOCH	25
Figure 20, Interface de visualisation chaines WRF et MOLOCH	25
Figure 21, Exemple de visualisation WRF (gauche) et MOLOCH (droite).....	26
Figure 22, Exemple de diagramme de Taylor de vérification	26

1. Contexte

La Direction de la Météorologie Nationale du Niger (DMN) et l’Institut de Bioéconomie du Conseil National des Recherches d’Italie (IBE-CNR) collaborent depuis plus d’une quarantaine d’années dans le cadre de programmes bilatéraux Niger-Italie et multilatéraux avec l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) dont IBE-CNR assure un des Centres Régionaux de Formation (RTC).

La mise en œuvre récente des projets ANADIA Niger et ANADIA2 a permis de renforcer cette collaboration et d'accroître les capacités et les compétences de la DMN dans la fourniture de services climatiques pour la réduction des risques de catastrophe (inondations et sécheresse) et pour un meilleur rendement agricole. C'est dans cette même logique de réduction des risques liés aux inondations et d'augmentation de la résilience de la population face aux changements climatiques que le projet trilatéral SLAPIS Sahel a été soumis à la Coopération italienne. Son approbation permet de mettre à l'échelle l'approche SLAPIS, développé dans le cadre de ANADIA2, pour l'alerte précoce contre les inondations sur l'ensemble du bassin de la Sirba et d'autres tributaires du Niger moyen.

SLAPIS Sahel est un projet de Recherche appliquée et de formation, financé par l’Agence Italienne de Coopération au Développement. Le projet est réalisé par le Polytechnique de Turin en collaboration avec l’Institut de Bioéconomie du conseil National des recherches d’Italie (IBE-CNR), la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) du Niger, la Direction des Ressources en Eau (DRE) du Niger, l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) du Burkina Faso et la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) du Burkina Faso.

L'un des objectifs de SLAPIS Sahel est le renforcement des capacités en Prévision Numérique du Temps (PNT) comme support de l'alerte précoce hydrologique. En effet, la DMN et l'ANAM ont opté pour le choix stratégique de développer une chaîne de prévision numérique du temps basée sur le modèle WRF (Weather Research and Forecasting) qui est un modèle climatique régional, utilisé à la fois en recherche et en prévision opérationnelle du temps, développé principalement au National Center for Atmospheric Research (NCAR, Etats-Unis).

Dans le cadre du projet SLAPIS Sahel, les prévisions numériques du temps devraient être intégrées dans le système d'alerte précoce des crues éclairés, afin de contribuer à la vigilance des crues de la Sirba et du fleuve Niger.

Pour ce faire, le Niger et le Burkina Faso bénéficient de l'appui de l'IBE-CNR, un partenaire du Consorzio LaMMA qui assure le service météorologique régional de la région Toscane en Italie. LaMMA aussi utilise le modèle WRF en trois différentes configurations :

1. Le modèle WRF_GFS_12km fonctionne sur une grille lambertienne à résolution de 12 km sur une large zone couvrant toute la région méditerranéenne avec 50 niveaux verticaux et une paramétrisation des cumulus. Les données sur les conditions aux limites sont obtenues à partir du modèle global GFS (Global Forecasting System) du National Centre for Environmental Prediction (NCEP) à une résolution de 0,25 degré.
2. Le modèle WRF_GFS_3km fonctionne sur une grille lambertienne de 3 km de résolution sur une zone couvrant la péninsule italienne avec 50 niveaux verticaux sans paramétrage des cumulus (convection explicite). Les données sur les conditions aux limites sont obtenues à partir du modèle global GFS (Global Forecasting System) du National Centre for Environmental Prediction (NCEP) à une résolution de 0,25 degré.

3. Le modèle WRF_ECM_3km fonctionne sur une grille lambertienne de 3 km de résolution sur une zone couvrant la péninsule italienne avec 50 niveaux verticaux sans paramétrage des cumulus (convection explicite). Les données sur les conditions aux limites sont obtenues à partir du modèle global IFS (Integrated Forecasting System) du Centre européen (ECMWF) à une résolution de 0,125 degrés.

Avec le WRF-12km, 2 runs par jour (00 et 12 UTC) sont effectués avec les données GFS avec un horizon de prévision de 120 heures pour le run de 00 et 132 heures pour le run de 12 heures afin de toujours avoir 5 jours de prévision complets. Avec le WRF-3km, 4 runs par jour (00, 06, 12 et 18 UTC) sont effectués avec chacune des deux initialisations (GFS et IFS), pour un total de 8 runs par jour, avec un horizon de prévision de 48 heures pour le run de 00, 42 heures pour le run de 06, 60 heures pour le run de 12 et 54 heures pour le run de 18, de sorte qu'il y a 2 jours complets de prévision pour tous les runs.

Déjà avant le démarrage du projet SLAPIS Sahel, mais dans la perspective de son implémentation, IBE-CNR et DMN avaient réalisé un diagnostic afin d'établir un plan pour le renforcement des capacités de la DMN en PNT. Le diagnostic, réalisé en janvier 2023, a permis de mettre en évidence que la DMN:

- dispose d'une Division Prévisions Météorologiques, dotée de prévisionnistes, d'une salle de prévision météorologique et d'un studio météo média pour la réalisation du bulletin météo télévisé ;
- possède un réseau de 130 stations automatiques tout type confondu, dont actuellement 16 transmettent les données en temps réel ;
- reçoit des produits d'observation météo à travers la station PUMA/AMESD (affichage de cartes), EUMETCAST (affichage de cartes) et le site web ogimet (données numériques) ;
- accède aux produits de PNT à travers RSMC Dakar, MISVA. UKMET Office, ACMAD (RDT), NOAA (GFS); ECMWF, MeteoFrance (Arpege), AGRHYMET CCR-AOS
- La DMN a une infrastructure de calcul composée d'un HPC ou super calculateur avec un nœud maître de 48 cœurs et 3 nœuds de traitement de 96 cœurs chacun. Les nœuds sont connectés entre eux avec Infiniband (NVIDIA® Mellanox® SB7800 switch). En total le HPC a 288 cœurs, 768 Go de RAM et 6To de disque dur. Pour la sauvegarde des données, le HPC dispose d'un espace de stockage de 376 cœurs, 896 Go de RAM et 104 espaces de disque.
- bénéficie d'un débit internet de 20 Mbit/s en fibre optique.
- dispose de trois ingénieurs prévisionnistes, quatre ingénieurs informaticiens et deux techniciens informaticiens, 5 ingénieurs météo stagiaires et de deux informaticiens stagiaires.
- utilise une version de WRF installée pour des fins de test mais elle n'est pas opérationnelle

A la suite du diagnostic, un plan de renforcement des capacités en PNT de la DMN a été élaboré pour être mis en œuvre dans le cadre du projet SLAPIS Sahel.

L'objectif est de doter la DMN d'une chaîne opérationnelle de PNT basée sur WRF assurant 2 runs par jours avec horizon de prévision de 3 jours et une résolution spatiale de 2,5 km. Les données sur les conditions aux limites sont obtenues à partir du modèle global GFS (Global Forecasting System) du National Centre for Environmental Prediction (NCEP) à une résolution de 0,25 degré.

Le plan prévoit 4 étapes :

1. La première étape est préalable à toutes les autres. Elle inclue l'encadrement de base des prévisionnistes et des informaticiens de la DMN sur WRF. Il s'agira d'identifier les personnes ressources auprès de la DMN et de leur permettre de suivre des cours de formation à distance qui sont conseillés par IBE/ LaMMA (voir annexe 1). Cette étape inclue aussi la réhabilitation/réparation de l'infrastructure informatique du centre de calcul au besoin. Pour ce faire, La DMN s'est engagé à donner un accès à distance au serveur pour vérifier l'installation de tous les paquets software nécessaires.
2. La deuxième étape prévoit l'installation de la dernière version de WRF, la création des procédures de téléchargement des données sur les conditions au contour de GFS, la formation des prévisionnistes et des informaticiens, l'exécution sous forme de test pendant 6 mois (incluant au moins quelque mois de saison des pluies). Cette étape se réalisera en partie sur place à Niamey et en partie à distance.
3. La troisième étape concerne la vérification des résultats du test. Pour ce faire, il faudra un stagiaire auprès de la DMN dédié à l'analyse des résultats. Il sera encadré par les experts de IBE/LaMMA à distance.
4. La quatrième étape sert au réglage fin du modèle et se réalisera en partie sur place et en partie à distance.

Une fois la chaîne prête en pré-opérationnel et le personnel formé, une période de test opérationnel pendant une saison de pluies est prévue avant de passer à la phase suivante, d'assimilation des données observées par la DMN.

Au Burkina Faso, l'ANAM (Agence Nationale de la Météorologie) s'est engagée déjà depuis 2018 à opérationnaliser une chaîne de prévisions numériques avec le modèle WRF à travers plusieurs initiatives parmi lesquelles le projet HYDROMET de la Banque Mondiale et le projet CREWS de l'Organisation Météorologique Mondiale.

Les infrastructures et équipements informatiques incluent un High Performance Computing (HPC) ou super calculateur, qui est très performant et fonctionne sous un environnement almalinux 8.8 avec deux réseaux (1 interne en infini-bande et un réseau ethernet). Ce HPC a été acquis en 2018 mais il a commencé à être opérationnel en juin 2023. De façon spécifique, il fonctionne avec 10 nœuds de calcul totalisant 480 cœurs de 2 nœuds de stockage de 130 To de stockage utile. EN 2025 le cluster de l'ANAM sera renforcé avec 2 nœuds supplémentaires.

Le modèle WRF (ARW) est opérationnel au Burkina Faso depuis juin 2023 avec 2 Runs sur un domaine nesté (9 Km et 3 Km de résolution). Les différents paramètres de sortie sont utilisés dans le domaine de la Prévision Numérique du Temps (PNT). Des perspectives de développement d'autres applications ont été proposées dont entre autres l'opérationnalisation d'autres modèles comme : WRF-Solar, WRF-CHEM (poussière, pollution, santé, énergie, ...) et le WRF-Hydro coupled (inondations -SLAPIS-). De plus, l'ANAM est appuyé par le NordCap avec la mise à disposition d'un expert en WRF. Mais la principale difficulté est l'insuffisance de formation dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation du modèle.

2. Activités réalisées

En février 2023, bien que le projet SLAPIS Sahel n'ait pas encore officiellement démarré, la DMN, l'IBE-CNR et le consortium LaMMA ont pris l'initiative de lancer les activités prévues dans le plan en

mobilisant leurs propres ressources humaines et financières. Pour cette phase préparatoire, l'IBE-CNR et LaMMA ont déployé deux experts – l'un spécialisé en prévision météorologique, l'autre en modélisation – et une mission a été organisée au Niger. Parallèlement, la DMN a constitué une équipe interne dédiée au modèle WRF et a organisé, à ses propres frais, une session de formation en février 2023.

2.1 Atelier de formation 2023

Les travaux de cette formation se sont déroulés du 27 février au 3 mars 2023 à Niamey Niger avec la présence de 15 participants dont 10 de la DMN, 3 de IBE-CNR, un de l'Université de Niamey (UAM) et un du Centre Régional AGRHYMET (CRA). L'objectif principal de cette formation était de :

- Etablir une équipe mixte nigéro-italienne pour opérationnaliser la chaîne de prévision WRF au Niger ;
- Installer et paramétriser le modèle WRF sur le Niger ;
- Fournir une formation de base dans la gestion du modèle.

A la suite des 5 jours de formation, l'équipe WRF a été mise en place avec des tâches spécifiques dédiées aux sous équipes d'experts en informatique, en modélisation et en interprétation des produits, les trois sous-équipes ont été appuyées par les experts italiens, de l'UAM et du CRA.

La formation a aussi permis de rédiger une feuille de route pour le pré-test de WRF pendant la saison 2023, en particulier il s'agissait, à partir du 1^{er} d'Avril de vérifier la disponibilité des prévisions des runs de 00h et 12h et sur un tableau Google sheet reportant les jours de chaque mois noter "OUI" ou "NON" des RUNS effectués ou pas.

Pour ce faire, une procédure a été adoptée au cas où le modèle n'a pas tourné "non" les prévisionnistes avertissent par email les modélistes afin que des dispositions soient prises. Les modélistes quant à eux, ils doivent signaler le problème et la nature de l'erreur dans le tableau.

A l'issue de cette formation, des recommandations ont été adressées à la. En particulier il s'agit de : : remplacer l'onduleur de 10 KVA par un onduleur de 20 KVA pour sécuriser le calculateur de la DMN ; refaire le câblage du réseau informatique de la salle du calculateur ; procéder à l'acquisition des accessoires (cartes d'extension et fibre optique de connexion) pour l'exploitation du switch infini Band pour l'optimisation des performances du calculateur.

2.2 Pre-test 2023

Suite à cette formation, le modèle WRF peut tourner en pré-test avec une résolution de 4 kilomètres sur l'ensemble du pays en 4 runs (00h, 6h, 12h et 18h). Les produits de prévision étaient accessibles à travers une interface html.




Figure 1, Interface de visualisation WRF DMN

Le modèle a commencé à tourner au début du mois de juillet quand les onduleurs ont été remplacés pour éviter des problèmes de sécurisation du HPC en cas de coupure de l'électricité. Le modèle a tourné jusqu'en début du mois d'août quand un autre problème sur le HPC a bloqué le WRF jusqu'en début septembre et depuis lors il a tourné régulièrement. A la fin de la saison, le nombre limité de prévisions réalisées n'ont pas permis de faire une vérification statistiquement significative.

date	Run 00_06_12_18	problème
07/07/23 au 03/08/23		bonne réception
		d'internet, électricité,
10/08/23 au 05/09/23		inaccessibilité au serveur
06/09/23 au 11/10/23		bonne réception

Figure 2, Disponibilité des différents runs à la DMN en 2023

Au Burkina, WRF était aussi en phase de pré-test et il a tourné sur HPC pour la première fois pendant l'hivernage 2023. Malheureusement, à cause d'un crash, les produits WRF 2023 ont été complètement perdus empêchant toute vérification.

NIGER

```

&physics
mp_physics
ra_lw_physics
ra_sw_physics
radt
sf_sfclay_physics
sf_surface_physics
bl_pbl_physics
bldt
cu_physics
cudt
isfflx
ifsnow
icloud
surface_input_source
num_soil_layers
sf_urban_physics
/

```

BURKINA

```

&physics
mp_physics
ra_lw_physics
ra_sw_physics
radt
sf_sfclay_physics
sf_surface_physics
bl_pbl_physics
bldt
cu_physics
cudt
isfflx
ifsnow
icloud
surface_input_source
num_soil_layers
sf_urban_physics
/

```

Figure 3, Configurations de WRF, au Niger et Burkina en 2023

NIGER 2**BURKINA 3****ITALIE 8**

mp_physics (max_dom)	microphysics option	
0	no microphysics	
1	Kessler scheme: A warm-rain (i.e. no ice) scheme used commonly in idealized cloud modeling studies.	
2	Lin et al. scheme: a sophisticated scheme that has ice, snow and graupel processes, suitable for real-data high-resolution simulations.	
3	WRF Single-Moment (WSM) 3-class simple ice scheme: A simple efficient scheme with ice and snow processes suitable for mesoscale grid sizes.	
4	WRF Single-Moment (WSM) 5-class scheme. A slightly more sophisticated version of option 3 that allows for mixed-phase processes and super-cooled water. This scheme has been preliminarily tested for WRF-NMM.	
5	Ferrier scheme: A scheme that includes prognostic mixed-phase processes. This scheme was recently changed so that ice saturation is assumed at temperatures colder than -30C rather than -10C as in the original implementation. This scheme is well tested for WRF-NMM, used operationally at NCEP.	
6	WSM 6-class graupel scheme: A new scheme with ice, snow and graupel processes suitable for high-resolution simulations. This scheme has been preliminarily tested for WRF-NMM.	
7	Goddard GCE scheme (also uses gfcgce_hail, gfcgce_2ice)	
8	Thompson graupel scheme: a scheme with six classes of moisture species plus number concentration for ice as prognostic variables. This scheme has been preliminarily tested for WRF-NMM.	

Figure 4, Microphysique de WRF au Niger, Burkina et Italie en 2023

2.3 Atelier de formation 2024

Un séminaire de formation action sur le WRF a été organisé du 13 au 16 février 2024 à Niamey au Niger par le projet SLAPIS Sahel.

Ce séminaire a regroupé les experts en prévisions météorologiques, hydrologiques et en modélisation du Burkina Faso, du Niger et de l'Institut de BioEconomie d'Italie. Le modèle WRF étant déjà opérationnel au Niger et au Burkina Faso, ce séminaire fut un rendez-vous d'échange de connaissances et d'expériences afin d'affiner davantage les prévisions météorologiques et de dégager les pistes d'amélioration du modèle.

De façon spécifique, ce séminaire a regroupé 24 participants dont trois (3) de l'Agence Nationale de la Météorologie du Burkina Faso, deux (2) de l'Institut Bio-économie de l'Italie , deux (2) du Centre Régional AGRHYMET un (1) de l'Université Abdou Moumouni , deux (2) de la Direction des Ressources en Eau du Niger et quatorze (14) de la Direction de la Météorologie Nationale .

Ce Séminaire visait à partager les expériences des équipes du Burkina Faso, de l'Italie et du Niger dans l'opérationnalisation du modèle WRF et de discuter des possibilités d'amélioration de la performance du modèle. Spécifiquement, les objectifs visés étaient d' :

- approfondir la connaissance sur le modèle WRF et de son architecture des équipes du Burkina Faso et du Niger ;
- évaluer la performance du modèle WRF au Burkina Faso et au Niger ;
- prendre en compte les attentes des prévisionnistes, modélisateurs et spécialités du réseau du Burkina Faso et du Niger ;
- discuter sur la configuration du modèle WRF tant pour le Burkina Faso que pour le Niger ;
- dégager les stratégies d'amélioration conjointe de la performance du WRF ;
- élaborer un plan d'actions conjoint aux deux pays (Niger et Burkina Faso).

Après 4 jours de travaux les principaux résultats atteints ont été :

- 1) Compréhension des principaux problèmes : La DMN a rencontré des difficultés dans la mise en œuvre du WRF au Niger depuis 2023 qui étaient liées principalement aux coupures d'électricité, mise en veille automatique du système d'exploitation et de l'instabilité du réseau internet. Ces problèmes justifient les 45 jours de run du modèle WRF pendant toute la saison 2023. Des solutions ont été trouvées pour certaines contraintes et d'autres sont en cours d'évaluation. Une meilleure exploitation de WRF est espérée au cours de l'année 2024. L'ANAM qui a tourné le WRF pendant la saison 2023 a quant à elle perdu tous les produits de ce dernier à cause d'un crash du nœud de stockage du HCP. C'est pourquoi, aucune vérification sur la qualité des prévisions n'a été faite.
- 2) Elaboration d'un plan d'action conjoint pour la vérification des prévisions dans les deux pays. Ce plan d'action s'articulait sur l'utilisation des données de précipitations de CHIRPS et de TAMSAT mergées avec les observations locales (mergées) pour la vérification des prévisions. Aussi, il prévoyait de refaire tourner le modèle pour la saison 2023 avec les configurations du Burkina et du Niger. L'outil de validation prévu était un script sur R. Pour ce qui concerne les prévisions 2024, la validation du WRF à long terme aurait porté sur les paramètres vent, température et l'humidité en plus de la pluviométrie.
- 3) Formulation de recommandations à l'endroit de la DMN et de l'ANAM, en particulier mettre en place des équipes dédiées à l'évaluation de WRF et les mettre dans les conditions de finaliser ce travail ; définir et partager une feuille de route conjointe qui décrit succinctement les tâches

et responsabilités des équipes mises en place au niveau national (Burkina Faso & Niger) ; renforcer les capacités des cadres sur le hardware HPC et l'administration système (formation certifiante) ; renforcer le système de conditionnement des salles serveur ; mettre en œuvre un système d'alerte et extinction incendies ; opérationnaliser le système de messagerie d'alerte pour le calculateur, mettre en place une cellule de permanence de suivi du calculateur et d'autres équipements sensibles.


- 4) Formulation des recommandations à l'endroit du Projet SLAPIS Sahel : Renforcer les capacités de la DMN et de l'ANAM sur le WRF ; Augmenter le domaine Niger à l'Ouest de 2 degrés ; Activer sur le site du WRF Niger des nouvelles fonctions et paramètres et améliorer la page de visualisation html avec la vérification des variables à cartographier ; ajouter à la page de visualisation html les prévisions des modèles de GFS, ICON, ECMWF ; faire une étude de faisabilité de la mise en place d'un modèle WRF (domaine & configuration) qui couvre le Niger et le Burkina sur un cloud en parallèle aux systèmes existants dans les deux pays ; étudier les possibilités d'utilisation de l'Intelligence Artificielle dans les prévisions météorologiques des deux pays.

2.4 Test 2024


Avant le démarrage de la saison des pluies 2024, l'équipe nigero-italienne a modifié la paramétrisation de WRF au Niger en utilisant le "NCAR Tropical Physics Suite for WRF" qui en principe devrait mieux représenter la microphysique des régions tropicales par rapport à l'ancien Lin et al. schème. Suite à une période d'« observation » la nouvelle paramétrisation a été retenue et a tournée en opérationnel le-long de la saison 2024. Au Burkina Faso le WRF a tourné avec la configuration WRF Single Moment (WSM) comme d'ailleurs en 2023.

2.4.1 Niger


Le modèle WRF a tourné régulièrement deux RUNS par jour (00h et 12h) à 4km de résolution de mars 2024 au 3 septembre quand le cluster de la DMN a eu un problème d'alimentation électrique et est tombé en panne. De par les analyses découlant de l'évaluation du modèle WRF Niger, au cours de la période Juin-Juillet Août-Septembre pour le paramètre précipitation, il ressort que le modèle arrive à détecter les systèmes convectifs surtout les événements extrême (Fig. 1, le 15 Août 2024 et Fig. 2, le 03 Septembre 2024). Toutefois, il faut noter que le modèle sous-estime le paramètre précipitation en début de saison.



A : modèle WRF à 15 UTC avec run de 00



B : image satellitaire 2024081515Z



C : modèle ECMWF 2024081515Z

Figure 5, Prévision du 15 août 2024




Figure 6, Prévision du 03 septembre 2024

Au cours de ladite période, on a aussi procédé à un suivi des paramètres. Il faut constater que les paramètres en vert sont ceux qui sont disponibles et ceux en rouge ne le sont pas.




Figure 7, Paramètres disponibles en 2024

A la fin de la saison les données mergées CHIRPS et TAMSAT sont disponibles au Niger grâce au travail effectué par les différentes équipes des prévisionnistes. Toutefois, certaines difficultés ont été soulignées, en particulier :

- Indisponibilité du server à partir de septembre liée à des problèmes du système d'exploitation sous licence;
- Indisponibilité/faible débit de la connexion internet pour le server par moments.

Des recommandations ont aussi été formulées :

- Accessibilité à tous les paramètres ;
- Avoir une animation sur les paramètres ;
- Accessibilité au run de 06h ;
- Superposition des paramètres.

2.4.2 Burkina Faso

Au Burkina Faso, l'ANAM a utilisé de manière opérationnelle le modèle WRF pendant l'hivernage 2024 dans le cadre du volet météorologique du projet SLAPIS. Globalement, l'utilisation du modèle WRF a permis de fournir des prévisions à haute résolution, essentielles pour anticiper les phénomènes météorologiques intenses caractéristiques de cette période de l'année.

Au début de la campagne agricole, le supercalculateur (HPC) a été inopérant pendant quelques jours, mais ce problème a été très vite résolu, permettant de reprendre la production des prévisions rapidement. Le modèle a été exécuté deux fois par jour à 9 Km et 3 Km de résolution: un run à 00h afin que les sorties soient disponibles au plus tard à 08h, et un autre run à 12h pour que les sorties soient disponibles vers 22h. Ces prévisions ont été utilisées par les prévisionnistes pour anticiper les orages et les épisodes de fortes précipitations, avec des cartes de précipitations prévues, de vent, et des indicateurs d'instabilité jouant un rôle essentiel dans l'élaboration des bulletins météorologiques et les alertes.




Figure 8, Fenêtres utilisées au Burkina Faso en 2024

En termes de difficultés, il a été constaté que les sorties du modèle prenaient plus de temps que prévu avant d'être disponibles, ce qui a parfois impacté la rapidité d'utilisation des prévisions par les équipes.

Pour l'avenir, plusieurs besoins ont été identifiés afin de renforcer l'opérationnalisation du modèle WRF. Il serait nécessaire de garantir une meilleure disponibilité du HPC, notamment par des mesures de maintenance préventive, pour minimiser les interruptions. En outre, des formations supplémentaires pour les prévisionnistes et les techniciens de maintenance sont recommandées afin de renforcer leurs capacités à interpréter les sorties du modèle, à maintenir le matériel, et à intégrer efficacement les prévisions dans les bulletins météorologiques. Une évaluation continue des performances du modèle est également cruciale pour ajuster les paramètres et ainsi augmenter la précision des prévisions. Ces améliorations permettront de maximiser l'impact du modèle WRF lors des prochaines saisons des pluies.

2.5 Stage de recherche en Italie

Afin de mieux supporter la DMN et l'ANAM dans l'opérationnalisation de WRF dans ses pays respectifs, IBE-CNR en accord avec les partenaires a décidé d'ouvrir deux positions de bourse de recherche destinées à un modélisateur de l'ANAM et un de la DMN afin qu'ils puissent se déplacer à Florence et travailler avec les collègues de IBE-CNR/LaMMA pour une période de 12 mois. L'objectif principal est de leur permettre de s'imprégner profondément dans la gestion, paramétrage, utilisation de WRF et des différents environnements de programmation tels que LINUX, Python, R. En particulier, les activités à réaliser étaient l'appui à la mise en œuvre de la modélisation météorologique numérique dans les services météorologiques nationaux du Niger et du Burkina Faso ; la prévision à posteriori de différentes configurations microphysiques, l'évaluation et la validation des produits de prévision météorologique ; la calibration et le réglage des modèles ; la création d'un manuel d'exploitation pour la gestion et la maintenance des modèles et la création d'ensembles de données climatologiques. L'avis de bourse a été publié le 17 juillet 2024 et la sélection a pris fin le 11/09/2024 avec l'assignation à M. Younoussa Adamou Sayri de la DMN et M. Thomas Bere de l'ANAM. Le stage a débuté le 12 novembre 2024 et prendra fin le 11 novembre 2025.

3. Vérification WRF

Des prévisions météorologiques précises et fiables sont un outil stratégique pour le Burkina Faso et le Niger, dont les économies dépendent fortement des précipitations pour l'agriculture, l'hydrologie, la santé et la gestion des risques climatiques. Les deux pays ont investi dans des calculateurs haute performance (HPC) pour générer des prévisions numériques du temps à haute résolution (3 km au Burkina Faso et 4 km au Niger) depuis 2023. Les deux chaînes de prévision WRF du Niger et du Burkina ont des configurations différentes et aucune des deux a été jamais évaluée d'une manière systématique et quantitative. L'objectif de cette activité est d'évaluer la performance des deux chaînes de prévision. La vérification permet de mieux comprendre les faiblesses et les forces des systèmes de prévision, ce qui permet une utilisation plus complète des informations contenues dans les prévisions. Malheureusement les produits de prévision pour les années passées sont incomplets ou absentes. Par conséquent, il est nécessaire de recalculer en hindcast les prévisions avec les deux configurations qui seront appelées WRF_Niger et WRF_Burkina pour simplicité.

3.1 JAS 2023-2024

L'évaluation des performances du modèle WRF (Weather Research and Forecasting Model) pour les mois de juillet-août-septembre (JAS) des années 2023 et 2024 a été réalisé pendant le stage de R. Thomas BERE et Younoussa Adamou Sayri à Florence avec l'encadrement et le support de Francesco Pasi et Valerio Capecchi.

3.1.1 Hindcast

Le LaMMA a mis à disposition de l'équipe un cluster composé par 8 nodes, chacun de 32 processeurs pour un total 256 processeurs Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz à 32 cores. Sur le cluster la version 4.1 de WRF est installé. Le domaine utilisé (Figure 9) couvre l'ensemble du territoire du Niger et du Burkina Faso, s'étendant au Sud jusqu'au Golfe de Guinée et à l'Est jusqu'au Tchad.



Figure 9, Domaine utilisé pour la vérification de WRF

Les données d'initialisation sont celles du modèle global GFS et le run de 18h est utilisée avec une simulation de 36h. Les cumuls 00h-00h sont utilisés pour la comparaison avec les estimations satellites tandis que les cumuls 06h – 06h sont utilisés pour la comparaison avec les données stations.

Deux configurations différentes de WRF sont utilisées (Figure 10 et Figure 11). De la configuration du Burkina on a retenu seulement celle à 3 km (colonne de droite).

```

1 &physics
2 physics_suite = 'tropical'
3 ! hysics_suite = 'tropical', les paramètres sont configurés comme suit :
4 ! mp_physics = 6,
5 ! cu_physics = 16,
6 ! ra_lw_physics = 4,
7 ! ra_sw_physics = 4,
8 ! bl_pbl_physics = 1,
9 ! sf_sfclay_physics = 91,
10 ! sf_surface_physics = 2,
11 radt = 15,
12 bldt = 0,
13 cldt = 5,
14 icloud = 1,
15 num_land_cat = 21,
16 sf_urban_physics = 0,
17 fractional_seaice = 1,
18 /

```

Figure 10, Configuration WRF-Niger

```

1 &physics
2 mp_physics = 8, 8,
3 ra_lw_physics = 4, 4,
4 ra_sw_physics = 4, 4,
5 radt = 9, 3,
6 sf_sfclay_physics = 2, 2,
7 sf_surface_physics = 2, 2,
8 bl_pbl_physics = 2, 2,
9 bldt = 0, 0,
10 cu_physics = 1, 0,
11 cldt = 5, 5,
12 isfflx = 1,
13 ifsnow = 0,
14 icloud = 1,
15 surface_input_source = 1,
16 num_soil_layers = 4,
17 sf_urban_physics = 0, 0,
18 maxiens = 1,
19 maxens = 3,
20 maxens2 = 3,
21 maxens3 = 16,
22 ensdim = 144,
23 /
24
25 &fdda

```

Figure 11, Configuration WRF-Burkina

Des prévisions sont extraites seulement les variables d'intérêt, mais le reste est sauvegardé pour d'analyses ultérieures.

3.1.2 Méthodes d'évaluation

Un aspect crucial du travail a été la définition de la méthodologie de vérification des prévisions, c'est-à-dire le processus d'évaluation de la qualité des prévisions avec les observations réelles. Deux approches différentes ont été retenus. D'une part la comparaison ponctuelle entre prévisions et observations des réseaux officiels de DMN et ANAM. De l'autre, la comparaison des prévisions avec des estimations satellites de précipitation comme CHIRPS, et TAMSAT. Dans le premier cas, il s'agit d'extraire des raster de la prévision le paramètre souhaité (dans notre cas la précipitation cumulée sur 24h de 06h à 06h) avec la méthode du nearest neighbour. Puis, pour toutes les couples prévu/observé calculer les différents scores de compétence utilisés pour évaluer les modèles (Figure 12), notamment l'Erreur Moyenne (ME), l'Erreur Absolue Moyenne (MAE), l'Erreur Quadratique Moyenne (RMSE) et le coefficient de corrélation de Pearson, ainsi que les indices binaires (bias, POD, CSI, FAR).

Vérification basée sur les données stations:

- Traitement des précipitations en tant que variables continues:
 - Erreur moyenne : $ME = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_k - o_k) = \bar{y} - \bar{o}$
 - Erreur absolue moyenne (MAE) : $MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_k - o_k|$
 - Coefficient de corrélation
- Traitement des précipitations en tant que variable binaire:

$$\text{○ Bais: } B = \frac{a+b}{a+c}$$

$$\text{○ Probabilité de détection : } POD = \frac{a}{a+c}$$

$$\text{○ Critical Success Index: } CSI = \frac{a}{a+b+c}$$

○ Ratio des fausses alarmes

$$FAR = \frac{b}{a+b}$$

		Observations	
		yes	no
Prévisions	yes	Succès (a)	Fausses alarmes (b)
	no	Manquées (c)	Rejets corrects (d)

7

Figure 12, Scores de vérification ponctuelle

Dans le deuxième cas, la vérification spatiale a été réalisé avec le **Fraction Skill Score (FSS)**. Cette approche adresses le problème de la "double pénalité" : une prévision peut être considérée comme mauvaise si elle place correctement une averse, mais avec un léger décalage spatial. Pour surmonter cette difficulté, le FSS est calculé en comparant les fractions de zones où un seuil de précipitation est dépassé dans les prévisions et les observations, sur des grilles identiques (Figure 13). Cela permet d'évaluer la capacité du modèle à prévoir la distribution spatiale des précipitations, plutôt que de se focaliser uniquement sur la précision ponctuelle. Le FSS aide à mieux évaluer la qualité des prévisions à haute résolution.

Vérification spatiale

Fraction skill score:

- Prévisions et observations sont aux mêmes grilles
 - $I_o = \begin{cases} 1 & O_r \geq q \\ 0 & O_r < q \end{cases}$; $I_m = \begin{cases} 1 & y_r \geq q \\ 0 & y_r < q \end{cases}$




Figure 13, Fraction skill score

3.1.3 Résultats et Comparaison des Modèles

Une analyse comparative détaillée des performances des trois modèles de prévision des précipitations (GFS, WRF-Burkina Faso et WRF-Niger) a été réalisée sur la périodes JAS 2023 et 2024. Les résultats permettent une évaluation nuancée des forces et faiblesses de chaque modèle.

- **Métriques déterministes (ME, MAE, corrélation)**: Les résultats (Figure 14) ont indiqué que, en utilisant les métriques déterministes telles que l'Erreur Moyenne (ME), l'Erreur Absolue Moyenne (MAE) et la corrélation, la configuration du modèle WRF du Niger tendait à offrir les meilleurs résultats.




Figure 14. Scores deterministes

- **Fraction Skill Score (FSS)** : Cependant, l'analyse basée sur le Fraction Skill Score (Figure 15) a suggéré que la configuration de WRF qui tourne au Burkina Faso semblait meilleure en termes de prévisions significatives à faibles échelles pour des cumuls importants de précipitations.




Figure 15, Fractional Skill Scores

- Comparaison globale :** De manière générale, les deux modèles WRF (Burkina Faso et Niger) ont démontré des performances supérieures à celles du modèle global GFS.
- Analyse des cas d'étude :** L'analyse a inclus des études de cas spécifiques (par exemple, les événements des 20 et 30 août 2024) pour illustrer les performances des modèles dans des situations météorologiques particulières. Ces études de cas (Figure 16) ont permis d'examiner comment les modèles capturent les caractéristiques spatiales et temporelles des précipitations, notamment les pluies convectives.




Figure 16, Cas d'étude 20 aout 2024

- **Perspectives :** Comme perspectives d'amélioration, les auteurs ont exprimé le désir de faire tourner les deux modèles WRF en utilisant les données Open du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (ECMWF).

En conclusion, les résultats ont montré que les modèles WRF, tout en présentant des caractéristiques distinctes, surpassaient le modèle GFS. L'utilisation combinée de métriques déterministes et d'approches de vérification spatiale comme le FSS a permis une compréhension plus complète des capacités et des limites de chaque modèle.

3.2 Ateliers de restitution des résultats à la mi-parcours

Dans le cadre du projet SLAPIS Sahel, deux ateliers de pré-validation du modèle Weather Research and Forecasting (WRF-NIGER) ont été organisés le 16 et le 17 avril 2025 respectivement à l'ANAM du Burkina Faso et à la DMN du Niger.

Le **séminaire de Ouaga** s'est tenu dans la salle de conférence de l'ANAM et a réuni 12 experts de l'ANAM, de l'Université de Ouagadougou et d'Italie. Les objectifs de l'atelier étaient de :

- Présenter les résultats à mi-parcours de la validation du modèle WRF obtenus pendant les premiers 6 mois du stage à Florence de M Thomas R. Bere et M Younoussa Adamou Sayri
- Présenter les résultats de la validation réalisée par l'ANAM à Ouaga
- Présentation de la chaîne WRF de backup qui sera mise en place sur le serveur de Florence
- Discuter les perspectives d'amélioration de la chaîne opérationnelle à l'ANAM pour le 2025 et le 2026

Le séminaire a offert une vue d'ensemble précieuse des avancées et des défis actuels dans le domaine de la modélisation numérique du temps. Les présentations ont souligné l'importance cruciale de la collaboration scientifique internationale, illustrée par le partenariat fructueux entre l'Agence Nationale de la Météorologie et l'Italie, ainsi que le rôle central des outils de modélisation pour générer des informations météorologiques précises et pertinentes pour diverses applications.

Les discussions qui ont suivi les présentations ont permis d'approfondir plusieurs thématiques clés. Tout d'abord, la nécessité de renforcer les compétences en agrométéorologie par le biais de formations spécialisées a été mise en évidence. Ensuite, l'intérêt grandissant pour les modèles de prévision numérique à haute résolution, à l'instar de MOLOCH, capables d'améliorer significativement la précision des prévisions, a été souligné.

Par ailleurs, les défis complexes posés par la vérification des prévisions, notamment la prise en compte des dimensions spatiales, et la valeur ajoutée des méthodes d'évaluation telles que le Fraction Skill Score (FSS) ont été largement débattus. Enfin, les progrès constants réalisés dans l'évaluation des modèles WRF, ainsi que les perspectives prometteuses offertes par l'utilisation des données du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (ECMWF) et l'intégration de l'intelligence artificielle, ont suscité un vif intérêt.

En somme, ce séminaire a constitué une plateforme d'échange fructueuse, favorisant le partage de connaissances et d'expériences entre les acteurs de la météorologie. Il a également permis de consolider les liens entre les participants et d'identifier des pistes prometteuses pour de futures collaborations et innovations dans le domaine crucial de la prévision numérique du temps.

Le **Séminaire de Niamey** s'est tenu dans la salle de réunion de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) et a été simultanément diffusée en visioconférence afin que l'équipe de l'institut de BioEconomie d'Italie puisse y prendre part. Elle a réuni, d'une part, les membres de l'équipe WRF de la DMN, des représentants de la Direction des Ressources en Eau et de l'AGRHYMET et d'autre part, les experts de l'Agence Nationale de la Météorologie du Burkina Faso (ANAM) ainsi que ceux de l'Institut de BioÉconomie d'Italie, ces derniers en visioconférence. L'atelier visait comme objectifs principaux :

- Présenter les résultats de la validation du modèle WRF obtenus au cours des six premiers mois du stage à Florence par M. Younoussa Adamou Sayri et M. Thomas Beré.
- Présenter la chaîne WRF de sauvegarde qui sera mise en place sur le serveur de Florence.
- Discuter des perspectives d'amélioration de la chaîne opérationnelle à la DMN pour 2025 et 2026.

L'atelier, qui a vu la participation de 18 personnes en présentiel et 4 en visioconférence, a permis de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre de l'activité relative au développement du modèle WRF au Niger et au Burkina Faso. Les résultats des comparaisons des configurations pour le Niger et le Burkina Faso ouvrent la voie à des améliorations, notamment dans l'ajustement des paramètres des modèles pour mieux refléter les réalités climatiques de chaque pays.

4. MOLOCH

Suite aux discussions initiées lors des ateliers d'Avril 2025 à Niamey et Ouagadougou, portant sur la restitution des résultats préliminaires de la validation du modèle WRF et des perspectives d'amélioration des outils de prévision numérique, un intérêt marqué avait été exprimé par les services

météorologiques du Niger et du Burkina Faso pour le modèle opérationnel MOLOCH. En réponse à cet intérêt et dans le but d'explorer le potentiel de ce modèle pour les opérations de prévision dans la région, un séminaire de présentation dédiée au modèle MOLOCH a été organisée en visioconférence le 19 mai 2025. Ce séminaire a réuni les premiers responsables des services météorologiques du Niger et du Burkina Faso, leurs agents techniques, ainsi que les partenaires italiens impliqués dans les projets de collaboration scientifique et de renforcement des capacités. L'objectif principal de cette rencontre était de fournir une vue d'ensemble détaillée des caractéristiques, des capacités et des applications du modèle MOLOCH et en particulier de :

- Présenter en détail le modèle de prévision météorologique opérationnel ;
- Expliquer les caractéristiques techniques et les capacités de ce modèle ;
- Partager les résultats des tests et des comparaisons avec d'autres modèles ;
- Discuter du chronogramme des activités avenir au cours de la saison.

Le modèle opérationnel MOLOCH, développé par le CNR-ISAC, est utilisé par le LaMMA qui est un consortium entre le gouvernement de la Région Toscane et l'Istituto per la Bioeconomia du Conseil National des Recherches d'Italie, et il est reconnu comme le service météorologique de la Région Toscane. Le modèle MOLOCH a un noyau non hydrostatique, une grille Arakawa C, un système de coordonnées hybrides, un schéma de rayonnement (utilisant celui de ECMWF mis à jour en 2024), un modèle de turbulence et un schéma de sol DROPA. Le schéma de microphysique de MOLOCH utilise 5 hydrométéores et ne comprend pas de paramétrisation de grésil, contrairement à certains schémas de WRF. MOLOCH est utilisé dans diverses applications de prévisions de température et de précipitations pour l'Italie, l'Espagne, la Grèce.). La dernière version de MOLOCH est disponible sur GitLab: <https://gitlab.com/isac-meteo/globo-bolam-moloch>. Pour l'Afrique de l'Ouest, un test effectué a permis de vérifier les domaines de prévision de MOLOCH et WRF, soulignant les différences de résolution et de temps de calcul : modèle MOLOCH est deux ou trois fois plus rapide que le modèle WRF. Un aspect innovant de cette étude est le déploiement du modèle MOLOCH dans la région sahélienne. En effet, ce modèle est principalement utilisé dans les régions de moyenne latitude (Davolio et al., 2020) et, à notre connaissance, peu ou pas de tentatives ont été faites pour exécuter le modèle MOLOCH dans les régions tropicales en utilisant le traitement explicite de la convection.




Figure 17, MOLOCH vs WRF

L'évaluation préliminaire du modèle MOLOCH a été réalisée à travers plusieurs études de cas (Figure 18), en comparant ses prévisions à celles d'autres modèles (WRF, GFS) ainsi qu'aux observations. Pour ce faire, divers outils statistiques ont été mobilisés, notamment le Fraction Skill Score (FSS), le diagramme de performance, le diagramme de Taylor, ainsi que des analyses des cumuls des précipitations. Ces outils ont permis d'apprécier de manière objective la qualité et la fiabilité des prévisions produites par le modèle. À ce niveau, il est ressorti que pour la période JAS 2024, le modèle MOLOCH avait des performances comparables, voire supérieures, à celles du modèle WRF.




Figure 18, Cas d'étude MOLOCH

Un plan opérationnel (Figure 19) pour l'utilisation de MOLOCH à partir de juin 2025 et des activités de formation connexes a été dessiné. Il est prévu de faire tourner le modèle en opérationnel à partir du 1er Juin 2025 et de réaliser une plateforme de visualisation accessible à partir d'internet. Deux chaines opérationnelles seront mises en place (WRF et Moloch) qui tourneront deux fois par jour avec les initialisations de 00h et 12h de GFS. En perspective on pourra mettre en opérationnel aussi les deux chaines avec initialisation open data de ECMWF, une fois que des problèmes de pre-processing sont résolus. A la fin de la période JAS 2025, une évaluation complète de la performance du modèle sera réalisée sur les périodes JAS 2024 et 2025 et les résultats présentés à la DMN et à l'ANAM.



5. Chaines opérationnelles WRF et MOLOCH

Suite aux discussions initiées lors des ateliers d'Avril 2025 à Niamey et Ouagadougou et du séminaire en ligne sur MOLOCH du 19/05/2025, une chaîne opérationnelle de backup de WRF avec la configuration « Niger » et une nouvelle chaîne opérationnelle de PNT avec le modèle MOLOCH ont été implémentées par l'équipe LaMMA/IBE sur le cluster mis à disposition par le LaMMA. La première version de l'interface de visualisation (<http://149.139.16.6/slapis/>) des produits de PNT a été présentée en visioconférence le 11 juin 2025 (Figure 20).

SLAPIS - SAHEL

MODÈLE GLOBAL			
WRF04GFS	mer. 11-06-2025 00 UTC	 IMG	00 12
MOL03GFS	mer. 11-06-2025 00 UTC	 IMG	00 12
ARCHIVE			
WRF04GFS		ARCHIVE_IMG	ARCHIVE_GRIB
MOL03GFS		ARCHIVE_IMG	ARCHIVE_GRIB
EVALUATION			
WRF04GFS	2024	 IMG	00 12
MOL03GFS	mer. 11-06-2025 00 UTC	 IMG	00 12

Figure 20, Interface de visualisation chaines WRF et MOLOCH

L'interface de visualisation est composée de trois parties. La première pour la visualisation des variables générées par les modèles WRF et MOLOCH. A l'état actuel, ces modèles sont initialisés avec les données de GFS, mais en perspectives on devrait développer autres deux chaines alimentées par Open data de ECMWF. Deux runs par jour sont présentées : celle de 00 et celle de 12 heures. Le modèle MOLOCH à une résolution spatiale de 3 km sur une fenêtre ille couvrant l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, tandis que le modèle WRF à une résolution spatiale de 4 km sur une fenêtre couvrant Niger et Burkina Faso.




Figure 21, Exemple de visualisation WRF (gauche) et MOLOCH (droite)

La deuxième partie présente les archives des produits en format image et en format grb, qui pourraient être utiles pour les bulletins et aussi pour des ultérieures études de vérification.

La troisième partie est censée récolter les produits d'évaluation de ces modèles par rapport aux données observés de terrain ou de télédétection.




Figure 22, Exemple de diagramme de Taylor de vérification

Certains points sont toujours à améliorer :

- 1) Variables à afficher : à l'état actuel la plateforme contient seulement certaines variables de surface. La DMN a recommandé de développer toutes les variables déjà identifiées lors des formations de 2023 et 2024.

- 2) Codes couleurs : afin d'harmoniser les produits et de faciliter leur utilisation ainsi que leur évaluation, les codes couleurs déjà utilisés devraient être appliqués, en particulier ceux de l'ANAM ayant déjà une chaîne opérationnelle. Pour les variables qui ne sont pas encore utilisées des nouvelles codes couleurs doivent être proposées.
- 3) Fonds de carte : en préférence ils doivent être en blanc, éventuellement utiliser d'autres repères tels que le réseau hydrographique, en tout cas les fonds des deux chaînes doivent être les mêmes.
- 4) Suivi, évaluation et feedbacks : les équipes de l'ANAM et de la DMN sont fortement invités à utiliser les produits de prévision mis à disposition, à en évaluer qualitativement la qualité et à proposer des améliorations. Pour faciliter les échanges entre les équipes des briefings réguliers ont été proposés. Après discussion on a convenu d'organiser un briefing chaque 15 jours, pendant lequel l'évaluation quantitative sera présentée par ANAM et DMN et l'évaluation quantitative sera présentée par IBE-LaMMA. Les briefings auront une durée brève avec des sessions plus longues selon le besoin.
- 5) Compléments d'information : des fichiers d'explication des chaînes opérationnelles et des produits d'évaluation, ainsi que du contexte seront préparé et publiés sur la page.

6. Climatologie haute résolution Afrique de l'Ouest

Parmi les objectifs spécifiques du projet SLAPIS Sahel est de générer une simulation rétroactive (hindcast) à haute résolution et de longue durée pour la région d'intérêt. Cela sera réalisé par la réduction d'échelle dynamique des réanalyses ERA5 en utilisant le modèle MOLOCH. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du projet spécial ECMWF SPITBRAN 2018-2020, de sa prolongation (2022-2024), ainsi que de plusieurs projets similaires en cours en Italie (Cavalleri et al., 2024). Il a été démontré que, bien que cette simulation rétroactive n'assimile aucune observation, elle fournit des informations climatiques fiables, notamment en ce qui concerne les précipitations, lorsqu'elle est comparée à des réanalyses régionales (Capecchi et al., 2023 ; Cavalleri et al., 2024).

Les objectifs à moyen terme de cette simulation rétroactive sont doubles :

- Développer un jeu de données permettant d'alimenter des services climatiques pour des applications climatologiques, agricoles et surtout hydrologiques ;
- Fournir un jeu de données de référence pour l'entraînement d'un modèle régional de prévision météorologique basé sur l'apprentissage automatique (ML) dans le cadre de l'initiative Anemoi, servant de base à de futurs produits de prévision climatique basés sur le ML (conformément aux travaux de Nipen et al., 2024).

Bien qu'une résolution accrue et le recours à un traitement explicite de la convection permettent en général d'améliorer la représentation des processus atmosphériques à fine échelle, cela ne permet pas de surmonter les problèmes inhérents tels que les erreurs du modèle et les incertitudes liées aux conditions initiales et aux conditions aux frontières.

Néanmoins, l'aspect innovant de cette activité consiste à évaluer la faisabilité de la réduction d'échelle des données ERA5 dans les régions tropicales et à en analyser la fiabilité. Le modèle MOLOCH a été retenu en raison de sa rapidité exceptionnelle de simulation, entre 2 et 6 fois plus rapide (et donc plus économique) que d'autres modèles (Capecchi, 2021). Or, il est bien établi que la

rapidité de simulation est un facteur déterminant lorsqu'il s'agit de réaliser des simulations numériques du temps sur plusieurs décennies.

Pour ce faire, un Projet Spécial de 3 ans a été soumis et approuvé par ECMWF pour avoir les ressources de calcul nécessaires.

L'objectif du projet est de réaliser au moins 10 années de simulation pour chaque année du projet, à savoir les périodes décennales suivantes : 2011-2020, 2001-2009 et 1991-2000 respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année.

Dans cette perspective, les ressources demandées sont les suivantes :

DOMAINE	SBUs estimées pour simuler 1 jour	SBUs estimées pour simuler 1 année	SBUs estimées pour simuler 10 ans	SBUs demandés pour simuler 10 ans +10% overhead
~500X400 points	~750	~0.27 M	~2.7	~3 M

7. Conclusions

Dans ces deux années d'activités, des progrès sensibles ont été obtenus dans l'opérationnalisation de WRF surtout au Niger, où la chaîne de prévision WRF était en état embryonnaire. Au Burkina, où l'ANAM était déjà plus avancée dans l'utilisation de WRF, le projet a permis de renforcer les compétences de 3 personnes avec la formation de septembre 2024, de mettre en relation les experts du Burkina avec leurs collègues du Niger et de l'Italie et surtout de lancer le stage de longue durée démarré en novembre 2024. En total, dans le cadre de SLAPIS Sahel, les activités de formation-action suivantes ont été réalisées :

1. 27 février au 3 mars 2023, Niamey (Niger), « Renforcement des capacités du personnel de la Direction de la Météorologie Nationale en Prévision Numérique du Temps », 5 jours, 15 participants ;
2. 13 au 16 février 2024, Niamey (Niger), « Formation-Action Performance et réglage du modèle Weather Research and Forecasting (WRF) », 4 jours, 24 participants ;
3. 13 novembre 2024 – 12 novembre 2025, Florence (Italie), « Stage de longue durée Prévision Numérique du Temps pour l'alerte précoce contre les inondations », 12 mois, 2 participants ;
4. 16 avril 2025, Ouagadougou (Burkina Faso), « Atelier de validation des produits du modèle WRF », 1 jour, 12 participants ;
5. 17 avril 2025, Niamey (Niger), « Atelier de validation des produits du modèle WRF », 1 jour, 18 participants ;
6. 19 Mai 2025, en ligne, « Séminaire de formation-action sur le modèle opérationnel MOLOCH », 1 jour, 14 participants ;
7. 11 juin 2025, en ligne, « Présentation de l'interface graphique d'accès aux prévisions opérationnelles MOLOCH et WRF », 1 jour, 7 participants.

Toutefois des faiblesses restent évidentes, surtout pour ce qui concerne le hardware, sa gestion et maintenance. En effet les conditions de travail pour les supercalculateurs doivent être contrôlée avec

le plus grand soin. Climatisation et alimentation doivent être parfaitement maîtrisées, chose vraiment difficile tant à Ouagadougou que à Niamey. Pour minimiser ces risques, le choix plus prudent serait d'utiliser des serveurs dans le cloud, même si leur coût n'est pas négligeable. En considération de ces défis, le projet, grâce à la collaboration du LaMMA a mis en place à partir de juin 2025 une chaîne de backup de WRF et aussi une chaîne opérationnelle pour tester le modèle MOLOCH sur l'Afrique de l'Ouest.

Pour les prochains mois, les activités se concentreront sur la formation, le test opérationnel de MOLOCH, le calcul d'une climatologie downscalée de ERA5 avec MOLOCH, le test de l'utilisation des données Open data de ECMWF avec WRF et MOLOCH, la production de manuels d'exploitation et maintenance de WRF et l'écriture d'articles scientifiques.

Annexes

Annexe 1, Bibliographie

- Capecci, V. (2021). *Reforecasting Two Heavy-Precipitation Events with Three Convection-Permitting Ensembles*, *Weather and Forecasting*, 36(3), 769-790
- Capecci, V., Pasi, F., Gozzini, B. et al. *A convection-permitting and limited-area model hindcast driven by ERA5 data: precipitation performances in Italy*. *Clim Dyn* **61**, 1411–1437 (2023)
- Cavalleri, F. et al *Multi-scale assessment of high-resolution reanalysis precipitation fields over Italy*, *Atmospheric Research*, Volume 312, 2024,107734, <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2024.107734>.
- Davolio, S., Malguzzi, P., Drofa, O. et al. *The Piedmont flood of November 1994: a testbed of forecasting capabilities of the CNR-ISAC meteorological model suite*. *Bull. of Atmos. Sci. & Technol.* **1**, 263–282 (2020)
- Drofa, O., and P. Malguzzi, 2004: *Parameterization of microphysical processes in a nonhydrostatic prediction model*. *Proc. 14th Int. Conf. on Clouds and Precipitation (ICCP)*, Bologna, Italy, ICCP, 19–23
- Malguzzi, P., G. Grossi, A. Buzzi, R. Ranzi, and R. Buizza, 2006: *The 1966 “century” flood in Italy: A meteorological and hydrological revisit*. *J. Geophys. Res.*, 111, D24106, <https://doi.org/10.1029/2006JD007111>
- Nipen, TN. et al *Regional data-driven weather modeling with a global stretched-grid*, [https://arxiv.org/abs/2409.02891 \(2024\)](https://arxiv.org/abs/2409.02891)

Annexe 2, Ressources on-line pour la formation des Equipes

Afin de consentir aux personnes ressources de la DMN de profiter à plein des activités de renforcement des capacités sur la modélisation numérique du temps avec le modèle WRF, elles devront préalablement à la mise en œuvre du programme d'activités s'imprégner des concepts de base sur la modélisation numérique et sur le modèle WRF. Des nombreuses ressources sont disponibles sur le web. Ici nous proposons une liste non exhaustive des ressources disponibles, parmi lesquelles au moins la 4 est mandataire.

- 1) Page web de référence de WRF: <https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/>
- 2) Cours annuel synchrone de WRF organisés par NCAR: le prochain est programmé du 30 janvier au 3 février 2023. (<https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/tutorial/tutorial.html>). Pour recevoir les informations sur l'ouverture des inscriptions il faut s'enregistrer à la page <https://mailman.ucar.edu/mailman/listinfo/wrf-news>
- 3) Didacticiel asynchrone online basé sur les ressources du dernier cours synchrone à la page : <https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/OnLineTutorial/index.php>
- 4) Vidéo didacticiels https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ_1sjucSSZCTNBRM4D3BfEak-XT7TKJ0 , très bonne ressource, à suivre en particulier les vidéos 1-5, 7, 9-10. Les vidéos sont en anglais mais très simple et avec les sous-titres aussi en Français. Les présentations des vidéos tutoriels se trouvent aussi sur https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/tutorial/tutorial_presentations_2021.htm
- 5) WRF users guide: https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_v4/contents.html ou bien https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_v4/v4.4/contents.html Les deux liens se réfèrent à la dernière version du modèle la 4.4, que nous proposons d'installer à la DMN.

Annexe 3, Composition des Equipes

Pays	Role	Nom	email
Niger	Modelisateur	Alabe Adam	Kondoma_2014@yahoo.fr
Niger	Modelisateur	Adamou Sayri Younoussa	Sayriyouyou2282@gmail.com
Niger	Modelisateur	Ismael Ouattara	watta522@gmail.com
Niger	Prévisionniste	Ousman Baoua	ousmanebaoua@yahoo.fr
Niger	Prévisionniste	Mme Aminou Nafissa	Nafissadignon85@gmail.com
Niger	Prévisionniste	Mme Abdoul Razak Nadia	Nadiaamadou616@gmail.com
Niger	Prévisionniste	Omar Farouk	Farouko73@yahoo.com
Niger	Administrateur système	Moussa Saadou	S11doumouss1@yahoo.fr
Niger	IT	Mme Gouna Aichatou	gouna.aichatoua@yahoo.fr
Niger	IT	Omar Yahaya	omaryahaya89@gmail.com
Niger	IT	Mohamed Issifou Badjé	mohamedbadje@gmail.com
Niger	Support Modelisateur/Prévisionniste	Ibrah Seidou Sanda	ibrahs@gmail.com
Niger	Support Modelisateur/Prévisionniste	Abdoul Aziz Saidou Chaibou	abdoulaziz.saidou@yahoo.fr
Italie	Support Modelisateur/Prévisionniste	Valerio Capecchi	capecchi@lamma.toscana.it
Italie	Support Modelisateur/Prévisionniste	Francesco Pasi	pasi@lamma.toscana.it
Burkina Faso	Administrateur système	Oumar TRAORE	tloumar@hotmail.com
Burkina Faso	Modelisateur	Abdel Aziz T. KONSEIBO	kabdelazizt@yahoo.fr , kabdelazizt@gmail.com
Burkina Faso	Prévisionniste	Alfred Dango	poabalbi@yahoo.fr
Burkina Faso	Prévisionniste	Thomas Bere	bererthomas@gmail.com
Burkina Faso	Prévisionniste	Adaman Yoda	adamouyod@gmail.com
Burkina Faso	Prévisionniste	Isaac Yameogo	isaacyameogo06@gmail.com
Burkina Faso	Prévisionniste	Brahima Komboigo	bkomboigo@gmail.com
Burkina Faso	Prévisionniste	Rayimwende Zoungrana	rayimwendz@yahoo.com
Burkina Faso	Prévisionniste	Guillaume Nakoulma	guinabf@yahoo.fr